

**EGZAMIN MATURALNY  
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016**

**FORMUŁA OD 2015  
(„NOWA MATURA”)  
FORMUŁA DO 2014  
(„STARA MATURA”)**

**MATEMATYKA  
POZIOM PODSTAWOWY**

**ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ  
ARKUSZ MMA-P1**

**CZERWIEC 2016**

## Klucz punktowania zadań zamkniętych

Nr zad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Odp.	C	B	D	B	D	A	C	B	C	A	C	A	A	D	B	A	C	C	B	D	B	D	B	A	D

## Schematy oceniania zadań otwartych

### Zadanie 26. (0–2)

Rozwiąż równanie  $\frac{2x+1}{2x} = \frac{2x+1}{x+1}$ , gdzie  $x \neq -1$  i  $x \neq 0$ .

#### Rozwiązanie

Równanie ma sens liczbowy dla każdej liczby rzeczywistej  $x \neq -1$  i  $x \neq 0$ .

#### I sposób rozwiązania

Przekształcamy równanie w sposób równoważny

$$\begin{aligned} \frac{2x+1}{2x} - \frac{2x+1}{x+1} &= 0, \\ \frac{(2x+1)(x+1) - 2x(2x+1)}{2x(x+1)} &= 0, \\ \frac{2x^2 + 3x + 1 - 4x^2 - 2x}{2x(x+1)} &= 0, \\ \frac{-2x^2 + x + 1}{2x(x+1)} &= 0. \end{aligned}$$

Stąd otrzymujemy równanie kwadratowe

$$-2x^2 + x + 1 = 0.$$

Ponieważ  $\Delta = 1^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 1 = 9$ , to równanie ma dwa rozwiązania

$$x_1 = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = 1.$$

Każda z otrzymanych liczb jest różna od  $-1$  i od  $0$ . Zatem każda z tych liczb jest rozwiązaniem naszego równania.

#### II sposób rozwiązania

Przedstawiamy równanie w postaci równoważnej

$$(2x+1) \left( \frac{1}{2x} - \frac{1}{x+1} \right) = 0.$$

Z własności iloczynu, otrzymujemy

$$2x+1 = 0 \text{ lub } \frac{1}{2x} - \frac{1}{x+1} = 0.$$

Rozwiązaniem pierwszego z równań jest liczba  $x = -\frac{1}{2}$ .

Zapiszmy równanie  $\frac{1}{2x} - \frac{1}{x+1} = 0$  w postaci równoważnej

$$\frac{(x+1) - 2x}{2x(x+1)} = 0,$$

$$\frac{-x+1}{2x(x+1)} = 0.$$

Stąd  $x=1$ .

Każda z otrzymanych liczb jest różna od  $-1$  i od  $0$ . Zatem każda z tych liczb jest rozwiązaniem naszego równania.

### III sposób rozwiązania

Z własności proporcji możemy równanie zapisać w postaci równoważnej

$$(2x+1)(x+1) - 2x(2x+1) = 0,$$

$$(2x+1)(x+1-2x) = 0,$$

$$(2x+1)(1-x) = 0.$$

Stąd

$$2x+1=0 \text{ lub } 1-x=0,$$

$$x = -\frac{1}{2} \text{ lub } x=1.$$

Każda z otrzymanych liczb jest różna od  $-1$  i od  $0$ . Zatem każda z tych liczb jest rozwiązaniem naszego równania.

### Schemat punktowania

**Zdający otrzymuje ..... 1 p.**

gdy zapisze równanie w postaci

- równania kwadratowego w postaci uporządkowanej lub iloczynowej:  
 $-2x^2 + x + 1 = 0$ ,  $(2x+1)(1-x) = 0$

albo

- alternatywy równań, np.:  $2x+1=0$  lub  $\frac{1}{2x} - \frac{1}{x+1} = 0$

i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

**Zdający otrzymuje ..... 2 p.**

gdy wyznaczy rozwiązania równania:  $x_1 = -\frac{1}{2}$ ,  $x_2 = 1$ .

*Uwaga:*

Jeżeli zdający podzielił obie strony równania  $\frac{2x+1}{2x} = \frac{2x+1}{x+1}$  i nie zapisze, że  $2x+1 \neq 0$ , to

może otrzymać co najwyżej **1 punkt**.


**Zadanie 27. (0–2)**

Dane są proste o równaniach  $y = x + 2$  oraz  $y = -3x + b$ , które przecinają się w punkcie leżącym na osi  $Oy$  układu współrzędnych. Oblicz pole trójkąta, którego dwa boki zawierają się w danych prostych, a trzeci jest zawarty w osi  $Ox$ .

**Rozwiązanie**

Zauważmy, że prosta o równaniu  $y = x + 2$  przecina oś  $Oy$  w punkcie  $(0, 2)$ . Zatem współczynnik  $b$  w równaniu  $y = -3x + b$  jest równy 2, a więc druga z prostych ma równanie postaci  $y = -3x + 2$ .

Geometryczną ilustracją opisaną sytuacji jest trójkąt wskazany na wykresie.



Podstawa trójkąta ma długość  $2\frac{2}{3}$ , a jego wysokość jest równa 2. Zatem pole tego trójkąta jest równe

$$P_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{3} \cdot 2 = \frac{8}{3}.$$

**Schemat punktowania**

Zdający otrzymuje ..... 1 p.  
gdy

- zapisze wartość współczynnika  $b$  w równaniu prostej  $y = -3x + b$ :  $b = 2$

albo

- prawidłowo narysuje wykresy obu funkcji i zaznaczy punkt  $(0, 2)$ .

Zdający otrzymuje ..... 2 p.

gdy obliczy pole trójkąta:  $\frac{8}{3}$ .

**Zadanie 28. (0–2)**

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych  $x, y$  prawdziwa jest nierówność

$$x^4 + y^4 + x^2 + y^2 \geq 2(x^3 + y^3).$$

**Rozwiązanie****I sposób rozwiązania**

Zapiszmy nierówność  $x^4 + y^4 + x^2 + y^2 \geq 2(x^3 + y^3)$  w postaci równoważnej

$$x^4 - 2x^3 + x^2 + y^4 - 2y^3 + y^2 \geq 0,$$

$$(x^2 - x)^2 + (y^2 - y)^2 \geq 0.$$

Kwadrat każdej liczby rzeczywistej jest nieujemny, więc  $(x^2 - x)^2 \geq 0$  i  $(y^2 - y)^2 \geq 0$  dla dowolnych liczb rzeczywistych  $x$  i  $y$ . Suma dwóch liczb nieujemnych jest nieujemna, więc otrzymana nierówność jest prawdziwa dla dowolnych liczb rzeczywistych  $x$  i  $y$ .

## II sposób rozwiązania

Zapiszmy nierówność  $x^4 + y^4 + x^2 + y^2 \geq 2(x^3 + y^3)$  w postaci równoważnej

$$\begin{aligned}x^4 - 2x^3 + x^2 + y^4 - 2y^3 + y^2 &\geq 0, \\x^2(x^2 - 2x + 1) + y^2(y^2 - 2y + 1) &\geq 0, \\x^2(x-1)^2 + y^2(y-1)^2 &\geq 0.\end{aligned}$$

Kwadrat każdej liczby rzeczywistej jest nieujemny, więc  $x^2 \geq 0$ ,  $(x-1)^2 \geq 0$ ,  $y^2 \geq 0$  i  $(y-1)^2 \geq 0$  dla dowolnych liczb rzeczywistych  $x$  i  $y$ . Iloczyn liczb nieujemnych jest nieujemny, więc dla dowolnych liczb rzeczywistych  $x$  i  $y$  prawdziwe są nierówności  $x^2(x-1)^2 \geq 0$  i  $y^2(y-1)^2 \geq 0$ . Suma dwóch liczb nieujemnych jest nieujemna, więc otrzymana nierówność jest prawdziwa dla dowolnych liczb rzeczywistych  $x$  i  $y$ .

## Schemat punktowania

**Zdający otrzymuje ..... 1 p.**  
gdy

- zapisze nierówność w postaci  $(x^2 - x)^2 + (y^2 - y)^2 \geq 0$  i popełni błędy przy jej uzasadnianiu, np. przez zapisanie, że po lewej stronie są składniki dodatnie

albo


- $x^2(x-1)^2 + y^2(y-1)^2 \geq 0$  i popełnia błędy przy jej uzasadnianiu, np. przez zapisanie, że po lewej stronie są składniki dodatnie

i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

**Zdający otrzymuje ..... 2 p.**  
gdy zapisze wyrażenie w postaci sumy nieujemnych składników i sformułuje wniosek.

**Zadanie 29. (0–2)**


Dany jest trapez prostokątny  $ABCD$  o podstawach  $AB$  i  $CD$  oraz wysokości  $AD$ . Dwusieczna kąta  $ABC$  przecina ramię  $AD$  w punkcie  $E$  oraz dwusieczną kąta  $BCD$  w punkcie  $F$  (zobacz rysunek).



Wykaż, że w czworokącie  $CDEF$  sumy miar przeciwległych kątów są sobie równe.

**Rozwiązanie****I sposób rozwiązania**

Półproste  $BF$  i  $CF$  to dwusieczne kątów  $ABC$  i  $BCD$  przy ramieniu  $BC$  trapezu  $ABCD$ . Oznaczmy zatem miary tych kątów odpowiednio  $2\alpha$  i  $2\beta$  jak na rysunku.



Suma miar kątów trapezu przy jego ramieniu jest równa  $180^\circ$ , więc

$$\begin{aligned} 2\alpha + 2\beta &= 180^\circ, \\ \alpha + \beta &= 90^\circ. \end{aligned}$$

Suma miar kątów trójkąta jest równa  $180^\circ$ , więc miara kąta  $BFC$  jest równa

$$|\sphericalangle BFC| = 180^\circ - (\alpha + \beta) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ.$$

Stąd wynika, że

$$|\sphericalangle CFE| = 180^\circ - |\sphericalangle BFC| = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ.$$

Kąt  $CDE$  jest prosty, gdyż trapez jest prostokątny, więc suma miar przeciwległych kątów  $CDE$  i  $CFE$  czworokąta  $CDEF$  jest równa

$$|\sphericalangle CDE| + |\sphericalangle CFE| = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ.$$


Suma miar kątów czworokąta jest równa  $360^\circ$ , więc suma miar dwóch pozostałych kątów czworokąta  $CDEF$  jest równa

$$|\sphericalangle DCF| + |\sphericalangle DEF| = 360^\circ - 180^\circ = 180^\circ.$$

Zatem  $|\sphericalangle CDE| + |\sphericalangle CFE| = |\sphericalangle DCF| + |\sphericalangle DEF|$ , co kończy dowód.

## II sposób rozwiązania

Półproste  $BF$  i  $CF$  to dwusieczne kątów  $ABC$  i  $BCD$  przy ramieniu  $BC$  trapezu  $ABCD$ . Oznaczmy zatem miary tych kątów odpowiednio  $2\alpha$  i  $2\beta$  jak na rysunku.



Proste  $AB$  i  $CD$  są równoległe, więc naprzemianległe kąty  $BGC$  i  $DCG$  są równe, czyli  $|\sphericalangle BGC| = \beta$ .

Zatem trójkąt  $BCG$  jest równoramienny. Stąd i z równości kątów  $CBF$  i  $GBF$  wynika z kolei, że trójkąty  $BCF$  i  $BFG$  są przystające. Zatem ich kąty przy wierzchołku  $F$  są równe. Są to jednak kąty przyległe, więc są to kąty proste. W rezultacie

$$|\sphericalangle CFE| = 180^\circ - |\sphericalangle BFC| = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ.$$

Dalsza część dowodu przebiega tak, jak w I sposobie.


## Schemat punktowania I i II sposobu rozwiązania

Zdający otrzymuje ..... 1 p.  
gdy wyznaczy miarę kąta  $BFC$ :  $90^\circ$  i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

Zdający otrzymuje ..... 2 p.  
gdy przeprowadzi pełny dowód.

## III sposób rozwiązania

Półproste  $BF$  i  $CF$  to dwusieczne kątów  $ABC$  i  $BCD$  przy ramieniu  $BC$  trapezu  $ABCD$ . Oznaczmy zatem miary tych kątów odpowiednio  $2\alpha$  i  $2\beta$  jak na rysunku.



Trójkąt  $ABE$  jest prostokątny, więc  $|\sphericalangle BEA| = 90^\circ - \alpha$ . Zatem

$$|\sphericalangle DEF| = 180^\circ - |\sphericalangle BEA| = 180^\circ - (90^\circ - \alpha) = 90^\circ + \alpha.$$

Suma miar przeciwległych kątów  $DEF$  i  $DCF$  w czworokącie  $CDEF$  jest zatem równa

$$(1) \quad |\sphericalangle DEF| + |\sphericalangle DCF| = (90^\circ + \alpha) + \beta = 90^\circ + \alpha + \beta.$$

Kąt  $\sphericalangle CFE$  jest kątem zewnętrznym trójkąta  $CBF$ , więc

$$|\sphericalangle CFE| = \alpha + \beta.$$

Kąt  $\sphericalangle EDC$  jest prosty, gdyż trapez jest prostokątny, więc suma miar przeciwległych kątów  $\sphericalangle CDE$  i  $\sphericalangle CFE$  czworokąta  $CDEF$  jest równa

$$|\sphericalangle CDE| + |\sphericalangle CFE| = 90^\circ + \alpha + \beta.$$

Stąd i z (1) otrzymujemy  $|\sphericalangle DEF| + |\sphericalangle DCF| = |\sphericalangle CDE| + |\sphericalangle CFE|$ . To kończy dowód.

### Schemat punktowania III sposobu rozwiązania

**Zdający otrzymuje ..... 1 p.**


gdy wyznaczy miary kątów przy wierzchołkach  $E$  i  $F$  czworokąta  $CDEF$  w zależności od  $\alpha$  i  $\beta$ :  $|\sphericalangle AEB| = 90^\circ - \alpha$ ,  $|\sphericalangle CFE| = \alpha + \beta$  i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

**Zdający otrzymuje ..... 2 p.**

gdy przeprowadzi pełny dowód.

### Zadanie 30. (0–4)

W trójkącie  $ABC$  dane są długości boków  $|AB| = 15$  i  $|AC| = 12$  oraz  $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ , gdzie  $\alpha = \sphericalangle BAC$ . Na bokach  $AB$  i  $AC$  tego trójkąta obrano punkty odpowiednio  $D$  i  $E$  takie, że  $|BD| = 2|AD|$  i  $|AE| = 2|CE|$  (zobacz rysunek).



Oblicz pole

- trójkąta  $ADE$ .
- czworokąta  $BCED$ .

### Rozwiązanie I sposób

Ponieważ  $|BD| = 2|AD|$  i  $|AE| = 2|CE|$  oraz  $|AB| = 15$  i  $|AC| = 12$ , więc

$$|AD| = \frac{1}{3}|AB| = \frac{1}{3} \cdot 15 = 5 \text{ oraz } |AE| = \frac{2}{3}|AC| = \frac{2}{3} \cdot 12 = 8.$$

Z jedynki trygonometrycznej otrzymujemy

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5}.$$

Zatem pole trójkąta  $ABC$  jest równe

$$P_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot |AC| \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 12 \cdot \frac{3}{5} = 54,$$

a pole trójkąta  $ADE$  jest równe

$$P_{ADE} = \frac{1}{2} \cdot |AD| \cdot |AE| \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \frac{3}{5} = 12.$$




Zatem pole czworokąta  $BCDE$  jest równe

$$P_{BCDE} = P_{ABC} - P_{ADE} = 54 - 12 = 42.$$

### Rozwiązanie II sposób

Poprowadźmy wysokość  $CF$  trójkąta  $ABC$  oraz wysokość  $EG$  trójkąta  $ADE$  jak na rysunku.



Z trójkąta prostokątnego  $AFC$  otrzymujemy

$$\cos \alpha = \frac{|AF|}{|AC|}, \text{ czyli } \frac{4}{5} = \frac{|AF|}{12}.$$

$$\text{Stąd } |AF| = \frac{48}{5}.$$

Z twierdzenia Pitagorasa natomiast

$$\begin{aligned} |AC|^2 &= |AF|^2 + |CF|^2, \\ 12^2 &= \left(\frac{48}{5}\right)^2 + h^2. \end{aligned}$$

$$\text{Stąd } h = \sqrt{12^2 - \left(\frac{48}{5}\right)^2} = \frac{36}{5}.$$

Pole trójkąta  $ABC$  jest zatem równe

$$P_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot \frac{36}{5} = 54.$$

Trójkąty  $AFC$  i  $AGE$  są podobne, gdyż oba są prostokątne i mają wspólny kąt ostry przy wierzchołku  $A$ . Zatem

$$\frac{|EG|}{|CF|} = \frac{|AE|}{|AC|}.$$

Ponieważ  $|AE| = 2|CE|$ , więc  $|AE| = \frac{2}{3}|AC|$ . Otrzymujemy zatem

$$\frac{p}{\frac{36}{5}} = \frac{\frac{2}{3}|AC|}{|AC|} = \frac{2}{3}.$$

Stąd  $p = \frac{2}{3} \cdot \frac{36}{5} = \frac{24}{5}$ . Skoro  $|BD| = 2|AD|$  i  $|AB| = 15$ , to  $|AD| = \frac{1}{3}|AB| = \frac{1}{3} \cdot 15 = 5$ . Pole trójkąta  $ADE$  jest zatem równe


$$P_{ADE} = \frac{1}{2} \cdot |AD| \cdot p = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot \frac{24}{5} = 12.$$

Zatem pole czworokąta  $BCDE$  jest równe

$$P_{BCDE} = P_{ABC} - P_{ADE} = 54 - 12 = 42.$$

Uwaga:

Pole trójkąta  $ADE$  możemy też obliczyć inaczej. Poprowadźmy wysokość tego trójkąta z wierzchołka  $D$ .



Ponieważ  $|BD| = 2|AD|$  i  $|AB| = 15$ , więc  $|AD| = \frac{1}{3}|AB| = \frac{1}{3} \cdot 15 = 5$ .

Z trójkąta prostokątnego  $ADM$  otrzymujemy

$$\cos \alpha = \frac{|AM|}{|AD|}, \text{ czyli } \frac{4}{5} = \frac{|AM|}{5}.$$

Stąd  $|AM| = 4$ . Zatem z twierdzenia Pitagorasa dla tego trójkąta

$$q = \sqrt{|AD|^2 - |AM|^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3.$$

Skoro  $|AE| = 2|EC|$  i  $|AC| = 12$ , to  $|AE| = \frac{2}{3}|AC| = \frac{2}{3} \cdot 12 = 8$ . Pole trójkąta  $ADE$  jest zatem równe

$$P_{ADE} = \frac{1}{2} \cdot |AE| \cdot q = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 3 = 12.$$

### Schemat punktowania I i II sposobu rozwiązania

Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania ..... 1 p.

Zdający

- obliczy sinus kąta  $BAC$ :  $\sin \alpha = \frac{3}{5}$

albo

- długość jednego z odcinków  $AD, AE$ :  $|AD| = 5, |AE| = 8$

i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp ..... 2 p.

Zdający obliczy

- pole trójkąta  $ABC$ :  $P_{ABC} = 54$

albo

- obliczy  $\sin \alpha$  i długości obu odcinków  $AD$  i  $AE$ :  $\sin \alpha = \frac{3}{5}, |AD| = 5, |AE| = 8$ ,

albo

- wysokość trójkąta  $ADE$  opuszczoną z wierzchołka  $E$ :  $p = \frac{24}{5}$ ,

albo

- wysokość trójkąta  $ADE$  opuszczoną z wierzchołka  $D$ :  $q = 3$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania..... 3 p.**

Zdający obliczy pole trójkąta  $ADE$ :  $P_{ADE} = 12$ .

**Rozwiązanie pełne ..... 4 p.**

Zdający obliczy pole czworokąta  $BCDE$ :  $P_{BCDE} = 42$ .

*Uwaga:*

Jeżeli zdający rozwiązuje zadanie z wykorzystaniem faktu, że rozważany trójkąt jest prostokątny i nie przedstawia uzasadnienia tego faktu, to może otrzymać maksymalną liczbę punktów za całe rozwiązanie.

### Zadanie 31. (0–5)

Dany jest ciąg arytmetyczny  $(a_n)$  określony dla każdej liczby naturalnej  $n \geq 1$ , w którym  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2016$  oraz  $a_5 + a_6 + a_7 + \dots + a_{12} = 2016$ . Oblicz pierwszy wyraz, różnicę oraz najmniejszy dodatni wyraz ciągu  $(a_n)$ .

### Rozwiązanie

Rozwiązanie zadania składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na obliczeniu pierwszego wyrazu i różnicy ciągu  $(a_n)$ . Drugi etap polega na wyznaczeniu najmniejszego dodatniego wyrazu tego ciągu.

#### I sposób rozwiązania I etapu

Z warunków zadania wynika, że  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2016$  i  $a_5 + a_6 + \dots + a_{12} = 2016$ .

Ze wzoru na  $n$ -ty wyraz ciągu arytmetycznego otrzymujemy

$$\begin{aligned} a_1 + (a_1 + r) + (a_1 + 2r) + (a_1 + 3r) &= 2016 \quad \text{i} \quad (a_1 + 4r) + (a_1 + 5r) + \dots + (a_1 + 11r) = 2016, \\ 4a_1 + 6r &= 2016 \quad \text{i} \quad 8a_1 + 60r = 2016, \\ 2a_1 + 3r &= 1008 \quad \text{i} \quad 2a_1 + 15r = 504. \end{aligned}$$

Odejmując stronami równania, otrzymujemy

$$\begin{aligned} 12r &= -504, \\ r &= -42. \end{aligned}$$

Zatem  $2a_1 + 3 \cdot (-42) = 1008$ , więc  $a_1 = 504 + 3 \cdot 21 = 567$ .

#### II sposób rozwiązania I etapu

Z warunków zadania wynika, że  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2016$  i  $a_5 + a_6 + \dots + a_{12} = 2016$ .

Ze wzoru na  $n$ -ty wyraz ciągu arytmetycznego otrzymujemy

$$\begin{aligned} a_1 + (a_1 + r) + (a_1 + 2r) + (a_1 + 3r) &= 2016, \\ 4a_1 + 6r &= 2016, \\ 2a_1 + 3r &= 1008. \end{aligned}$$

Zauważmy, że lewa strona równania  $a_5 + a_6 + \dots + a_{12} = 2016$  jest sumą ośmiu wyrazów ciągu arytmetycznego  $(a_5, a_6, a_7, \dots, a_{12})$  o różnicy  $r$ . Ze wzoru na sumę  $n$ -początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, otrzymujemy

$$\begin{aligned} \frac{a_5 + a_{12}}{2} \cdot 8 &= 2016, \\ a_5 + a_{12} &= 504. \end{aligned}$$

Stąd i ze wzoru na  $n$ -ty wyraz ciągu arytmetycznego otrzymujemy

$$a_1 + 4r + a_1 + 11r = 504,$$

$$2a_1 + 15r = 504.$$

Po rozwiązaniu otrzymanego układu równań otrzymujemy  $a_1 = 567$  i  $r = -42$ .

### III sposób rozwiązania I etapu

Z warunków zadania wynika, że  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2016$  i  $a_5 + a_6 + \dots + a_{12} = 2016$ .

Zauważmy, że sumując te równania stronami, otrzymujemy  $a_1 + a_2 + \dots + a_{12} = 4032$ .

Otrzymaliśmy w ten sposób układ równań

$$S_4 = 2016 \text{ i } S_{12} = 4032,$$

który, korzystając ze wzoru na sumę  $n$ -początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, możemy zapisać w postaci

$$\frac{a_1 + a_4}{2} \cdot 4 = 2016 \text{ i } \frac{a_1 + a_{12}}{2} \cdot 12 = 4032,$$

$$a_1 + a_4 = 1008 \text{ i } a_1 + a_{12} = 672.$$

Ze wzoru na  $n$ -ty wyraz ciągu arytmetycznego otrzymujemy

$$a_1 + (a_1 + 3r) = 1008 \text{ i } a_1 + (a_1 + 11r) = 672,$$

$$2a_1 + 3r = 1008 \text{ i } 2a_1 + 11r = 672.$$

Po rozwiązaniu otrzymanego układu równań otrzymujemy  $a_1 = 567$  i  $r = -42$ .

### IV sposób rozwiązania I etapu

Z warunków zadania wynika, że  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2016$  i  $a_5 + a_6 + \dots + a_{12} = 2016$ .

Zauważmy, że

$$a_5 + a_6 + \dots + a_{12} = (a_1 + a_2 + \dots + a_{12}) - (a_1 + a_2 + a_3 + a_4),$$

czyli

$$a_5 + a_6 + \dots + a_{12} = S_{12} - S_4.$$

Otrzymaliśmy w ten sposób układ równań

$$S_4 = 2016 \text{ i } S_{12} - S_4 = 2016,$$

który, korzystając ze wzoru na sumę  $n$ -początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, możemy zapisać w postaci

$$\frac{a_1 + a_4}{2} \cdot 4 = 2016 \text{ i } \frac{a_1 + a_{12}}{2} \cdot 12 - \frac{a_1 + a_4}{2} \cdot 4 = 2016,$$

$$a_1 + a_4 = 1008 \text{ i } 6a_1 + 6a_{12} - 2a_1 - 2a_4 = 2016.$$

$$a_1 + a_4 = 1008 \text{ i } 4a_1 - 2a_4 + 6a_{12} = 2016.$$

Ze wzoru na  $n$ -ty wyraz ciągu arytmetycznego otrzymujemy

$$a_1 + (a_1 + 3r) = 1008 \text{ i } 4a_1 - 2(a_1 + 3r) + 6(a_1 + 11r) = 2016,$$

$$2a_1 + 3r = 1008 \text{ i } 8a_1 + 60r = 2016,$$

$$2a_1 + 3r = 1008 \text{ i } 2a_1 + 15r = 504.$$

Po rozwiązaniu otrzymanego układu równań otrzymujemy  $a_1 = 567$  i  $r = -42$ .

### Rozwiązanie II etapu

Ciąg  $(a_n)$  jest więc opisany wzorem ogólnym  $a_n = 567 + (n-1) \cdot (-42) = 609 - 42n$  dla  $n \geq 1$ .

Wyznaczymy numery wszystkich dodatnich wyrazów ciągu.

$$\begin{aligned} a_n &> 0, \\ 609 - 42n &> 0, \\ n &< \frac{609}{42} = 14\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Ponieważ  $r = -42 < 0$ , więc ciąg  $(a_n)$  jest malejący. Wynika stąd, że najmniejszym dodatnim wyrazem ciągu jest  $a_{14} = 609 - 42 \cdot 14 = 21$ .

*Uwaga:*

Najmniejszy dodatni wyraz ciągu  $(a_n)$  możemy też wyznaczyć w inny sposób. Ponieważ  $r = -42 < 0$ , więc ciąg  $(a_n)$  jest malejący. Zauważmy, że jednym z wyrazów ciągu  $(a_n)$  jest  $567 - 14 \cdot 42 = 21$ , a następnym  $21 - 42 = -21 < 0$ . Stąd wynika, że najmniejszy dodatni wyraz ciągu to 21.

### Schemat punktowania

**Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania ..... 1 p.**

Zdający zastosuje

- wzór na sumę  $n$ -początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i zapisze jedno z równań wynikających z treści zadania:

$$\frac{a_1 + a_4}{2} \cdot 4 = 2016, \quad 4a_1 + 6r = 2016, \quad \frac{a_5 + a_{12}}{2} \cdot 8 = 2016, \quad 8a_1 + 60r = 2016,$$

$$\frac{a_1 + a_{12}}{2} \cdot 12 = 4032$$

albo

- wzór na  $n$ -ty wyraz ciągu arytmetycznego i wyznaczy jeden z wyrazów  $a_n$  dla  $n > 1$  w zależności od  $a_1$  i  $r$ , np.  $a_2 = a_1 + r$

i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

Uwaga

Jeżeli zdający zapisze, że  $S_{12} = 4032$ , to otrzymuje **1 punkt**.

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp ..... 2 p.**

Zdający zapisze dwa równania wynikające z podanych sum wyrazów ciągu i wyznaczy jeden z wyrazów  $a_n$  dla  $n > 1$  w zależności od  $a_1$  i  $r$ , np.:

$$\frac{a_1 + a_4}{2} \cdot 4 = 2016 \quad \text{i} \quad \frac{a_5 + a_{12}}{2} \cdot 8 = 2016 \quad \text{i} \quad a_4 = a_1 + 3r.$$

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania ..... 3 p.**

Zdający zapisze układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi pozwalający obliczyć pierwszy wyraz i różnicę ciągu  $(a_n)$ , np.:

$$\frac{a_1 + a_1 + 3r}{2} \cdot 4 = 2016 \quad \text{i} \quad \frac{a_1 + 4r + a_1 + 11r}{2} \cdot 8 = 2016.$$

**Rozwiązanie prawie pełne ..... 4 p.**

Zdający

- obliczy pierwszy wyraz i różnicę ciągu  $(a_n)$ :  $a_1 = 567$ ,  $r = -42$

albo

- obliczy pierwszy wyraz, różnicę i najmniejszy dodatni wyraz ciągu  $(a_n)$ , popełniając po drodze błędy rachunkowe.

**Rozwiązanie pełne ..... 5 p.**

Zdający obliczy pierwszy wyraz, różnicę oraz najmniejszy dodatni wyraz ciągu  $(a_n)$ :

$$a_1 = 567, r = -42, a_{14} = 21.$$

*Uwagi:*


1. Jeżeli zdający błędnie zinterpretuje treść zadania przyjmując, że  $a_5 + a_6 + \dots + a_{12}$  jest sumą 12 początkowych wyrazów ciągu, to może otrzymać co najwyżej **1 punkt**.
2. Jeżeli zdający zauważy, że  $a_5 + a_6 + \dots + a_{12}$  jest sumą 8 wyrazów ciągu, ale zapisze błędnie, że jest ona równa  $\frac{2a_1 + (8-1)r}{2} \cdot 8$ , to może otrzymać za całe rozwiązanie co najwyżej **3 punkty**.
3. Jeżeli zdający zapisze, że  $a_5 + a_6 + \dots + a_{12}$  jest sumą 7 wyrazów ciągu i konsekwentnie zapisze tę sumę w postaci  $\frac{2a_5 + (7-1)r}{2} \cdot 7$ , to może otrzymać za całe rozwiązanie co najwyżej **3 punkty**.

**Zadanie 32. (0–4)**

Dany jest stożek o objętości  $8\pi$ , w którym stosunek wysokości do promienia podstawy jest równy  $3:8$ . Oblicz pole powierzchni bocznej tego stożka.

**Rozwiązanie**

Niech  $r$ ,  $h$  i  $l$  oznaczają odpowiednio promień podstawy, wysokość i tworzącą danego stożka.



Objętość stożka jest równa

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h.$$

Stąd

$$8\pi = \frac{1}{3}\pi r^2 h,$$

$$r^2 h = 24.$$

Z treści zadania wynika, że  $\frac{h}{r} = \frac{3}{8}$ , skąd  $h = \frac{3}{8}r$ .

Otrzymujemy równanie

$$r^2 \cdot \frac{3}{8}r = 24,$$

$$r^3 = 64,$$

$$r = 4.$$

Zatem  $h = \frac{3}{8} \cdot 4 = \frac{3}{2}$ .

Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta  $BSO$  otrzymujemy

$$r^2 + h^2 = l^2,$$
$$l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{4^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{73}{4}} = \frac{\sqrt{73}}{2}.$$

Pole powierzchni całkowitej stożka jest równe

$$P_b = \pi r l = \pi \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{73}}{2} = 2\sqrt{73} \pi.$$

### Schemat punktowania

**Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania** ..... 1 p.

Zdający zapisze zależność między wysokością i promieniem podstawy stożka

- wynikającą z podanego stosunku, np.:  $\frac{h}{r} = \frac{3}{8}$

albo

- wynikającą z podanej objętości:  $r^2 h = 24$

i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... 2 p.

Zdający zapisze równanie z jedną niewiadomą, np.:  $r^2 \cdot \frac{3}{8} r = 24$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... 3 p.

Zdający obliczy promień podstawy lub wysokość stożka:  $r = 4$ ,  $h = \frac{3}{2}$ .

**Rozwiązanie pełne** ..... 4 p.

Zdający obliczy pole powierzchni bocznej danego stożka:  $P_b = 2\sqrt{73} \pi$ .

### Zadanie 33. (0–4)

Rejsowy samolot z Warszawy do Rzymu przelatuje nad Austrią każdorazowo tą samą trasą z taką samą zakładaną prędkością przelotową. We wtorek jego średnia prędkość była o 10% większa niż prędkość przelotowa, a w czwartek średnia prędkość była o 10% mniejsza od zakładanej prędkości przelotowej. Czas przelotu nad Austrią w czwartek różnił się od wtorkowego o 12 minut. Jak długo trwał przelot tego samolotu nad Austrią we wtorek?

### Rozwiązanie

Oznaczmy przez  $v$  prędkość, z jaką zwykle leci samolot na tej trasie, przez  $s$  oznaczmy długość trasy, gdy samolot znajduje się nad terytorium Austrii, a przez  $t$  oznaczmy czas przelotu we wtorek. Zatem prędkość, z jaką samolot leciał we wtorek była równa  $1,1v$ , a prędkość, z jaką samolot leciał w czwartek była równa  $0,9v$ . Czas przelotu w czwartek był równy  $t+12$  minut. Zatem

$$1,1v \cdot t = s \text{ oraz } 0,9v \cdot (t+12) = s.$$

Stąd

$$1,1v \cdot t = 0,9v \cdot (t+12),$$

$$11t = 9(t+12),$$

$$2t = 9 \cdot 12,$$

$$t = 9 \cdot 6 = 54.$$

Odpowiedź: Czas, w jakim samolot przelatywał we wtorek nad Austrią był równy 54 minuty.

### **Schemat punktowania**

**Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania ..... 1 p.**

Zdający zapisze jedno z równań opisujących zależność prędkości i czasu przelotu nad Austrią, np.:  $1,1v \cdot t = s$  lub  $0,9v \cdot (t+12) = s$ .

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp ..... 2 p.**

Zdający zapisze oba równania pozwalające obliczyć czas przelotu nad Austrią we wtorek lub w czwartek, np.:  $1,1v \cdot t = 0,9v \cdot (t+12)$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania ..... 3 p.**

Zdający zapisze równanie z jedną niewiadomą  $t$ , np.:  $11t = 9(t+12)$ .

**Rozwiązanie pełne ..... 4 p.**

Zdający wyznaczy czas przelotu: 54 minuty (lub 0,9 godziny).

*Uwaga:*

Jeżeli zdający stosuje błędny model, np. przyjmuje, że wzrostowi prędkości o 10% odpowiada skrócenie czasu o 10% albo przyjmuje, że wzrostowi prędkości odpowiada wydłużenie czasu, to za całe rozwiązanie otrzymuje **0 punktów**.